

Systematisches Verzeichniss der Vögel Afrika's.

Von

Baron Dr. J. W. v. Müller.

(Fortsetzung von S. 193 — 208.)

375. *Zosterops chloronota* Gr.
Certhia borbonica Gm. — *Z. curvirostris* Sws. (nec Blyth.) —
 Pl. enl. 681. 2. — Vieill. Ois. dor. t. 28.
 St. Maurice.
376. *Z. curvirostris* Blyth.
 Journ. Asiat. Soc. XIV. p. 363 und XV. p. 44.
 St. Maurice.
377. *Z. lugubris* Hartl.
 Synops. sp. 164. — Hartl. Abh. naturh. Vereins. Hamburg II.
 t. 8. — Reichb. Merop. t. 462. f. 3306.
 Insel St. Thomä.
378. *Z. abyssinica* Guér.
 Rev. Zool. 1834. p. 165.
 Ostafrika.
379. *Z. pallida* Sw.
 Two Cent. and a Quarter p. 294.
380. *Z. lateralis* Sund.
 Mus. Holm. — Bp. Consp. p. 399.
 Kafferland.
381. *Z. virens* Sund.
 Mus. Holm. — Bp. Consp. p. 399.
 Kafferei.
- 38B. *Z. capensis* Sund.
 Mus. Holm. — Bp. Consp. p. 399.
 Kafferland.

6. Subfam. MOTACILLINAE.

383. *Motacilla alba* L.
M. cinerea Bodd. — *M. cinerea* Gm. — *M. albeola* Pall. —
 Pl. enl. 652. 674. — Gould. B. Eur. t. 143.
 Im nördlichen Afrika.
384. *M. capensis* L.
M. afra Gm. — Pl. enl. 28. 2. — Le Vieill. O.d'Afr. 177. —
 Kittl. Kupfert. 21. 2.
 Im südlichen Afrika. Häufig in Egypten und Nubien an den
 Nilkatarakten.
385. *M. longicauda* Rüpp.
 Neue Wirbelth. t. 29. 2.
 Abyssinien.
386. *M. Lichtensteini* Cab.
 Mus Heinean. I. S. 12. — *Mot. capensis* Licht. et Rüpp., nec
 Lin. — *Mot. vidua* Sundevar. part.

Nord-Ost-Afrika; Mozambique.

397. *Mot. Vaillantii* Cab.
Mus. Hein. I. S. 13. — Le Vaill. O. d'Afr t. 178. — *Mot. vidua* Sundev part.
Süd-Afrika
388. *Mot. gularis* Sws.
Birds of West. Afr. II. p 38. — Hartl. Synops sp. 165.
Am Senegal und Niger.
389. *Mot. flava* Lin.
M. flaveola Pall. — *M. chrysogastra* Bechst. — *M. neglecta* Gould. — Pl. enl. 674. 2. — Gould Birds Eur. 146. — Edw. Birds t. 258.
Nordafrika
390. *Mot. cinereocapilla* Savi.
M. Feldeggi Michah. — *M. dalmatica* Bruch — Bonap. Faun' Ital. t. 31. 2.
Nord-Ost-Afrika.
391. *Mot. melanocephala* Savi.
M. nigricapilla Bp. — Rüpp. Atl. t. 33. — Bonap. Faun. ital. t. 31. 3.
Nordafrika.
392. *Budytes Rayi* Bonap.
Mot. flava Ray. — *M. flaveola* Temm. — Gould Birds Eur. t. 145. — Le Maout Hist nat. des ois. p. 264. — Hartl. Synops. sp. 166.
In Senegambien, an der Goldküste und Cap Coast.
393. *Mot. nigricapilla* v. Müll.
Mot. melanocephala Licht. nec Savi — *Bud. melanocephala* Rüpp. Atl. t. 33. 6.
Nord-Ost-Afrika.
394. *Mot. sulphurea* Bechst
M. boarula auct. — *M. flava* Briss — *M. melanope* Pall. — Pl. enl. 28. 1. — Edw. Birds. 259. — Gould Birds Eur 147.
Soll in Nordafrika vorgekommen sein?
395. *Anthus spinoletta* (Lin.)
Anth. aquaticus Bechst — *Anth. montanus* Koch. — Pl. enl. 661. 2. — Exped. Eg Ois. t 5. 5.
Im Winter in Unteregyp ten und wahrscheinlich an N.-O.-Rande Afrika's.
396. *Anthus pratensis* (L.)
Alauda sepiaria Briss — *Anth. sepiarius* Vieill. — Pl. enl 660. 2. — Gould Birds Eur. 136.
Ueberwintert häufig in Nordafrika.
397. *Anthus cervinus* Keys. et Bl
Mot. cervina Pall. — *Anth. rufigularis* Brehm. — *Anth. Ceciliæ* Audouin — *Anth. aquaticus* Blyth. — Gould Birds Europ. t. 140. — Descr. de l'Eg. t. 5. fig. 6
Häufig im nördlichen und nordöstlichen Afrika.

398. *Anthus campestris* Bechst.
A. rufescens Temm. — *A. rufus* Vieill. — Pl. enl. 661 2. —
 Gould Birds Eur. t. 137.
 Im nordöstlichen Afrika, südlich bis Abyssinien und Kordofan
399. *Anthus Gouldi* Fras.
 Proc Zool. S 1843. p. 27. — Hartl. Synops. sp. 167.
 Fernando Po.
400. *Anthus Richardi* Vieill.
A. rupestris Ménétr. — *Corydalla Richardi* Vig. — *A. macronyx* Glog. — *A. longipes* Hollandre. — Gould Birds Europ. t. 135. — Roux Orn. Prov. t. 189. 190. — Zander, in Cab. Journ. f. Ornith., 1853, Extraheft, S. 61. — Id. Naumannia, 1854, S. 2.
 Nach Bonaparte und Zander im nördlichen Afrika?
401. *Anthus leucophrys* Vieill.
 Gal. Ois. t. 262.
 Südafrika.
402. *Anthus brevicaudus* Sundev.
 Mus. Holm.
 Südafrika.
403. *Anthus caffer* Sundev.
 Mus. Holm.
 Kafferland, Vorgebirge der guten Hoffnung, Port Natal.
404. *Anthus chloris* Licht.
 Cat. 1842. sp. 49.
 Südafrika.
405. *Anthus obtusipennis* Sundev.
 Mus. Holm.
 Südafrika.
406. *Anthus Raalteni* Temm.
 Licht. Catal. sp. 54.
 Südafrika.
407. *Anthus cinnamomeus* Rüpp.
 Neue Wirbelth. p. 103.
 Provinz Simen, in Abyssinien.
408. *Anthus sordidus* Rüpp.
 Neue Wirbelth. t. 39. 1. — *A. Gouldi* Fras.
 Abyssinien.
409. *Anthus scapularis* Licht.
 Cat. sp. 50.
 Südafrika.
410. *Anthus arboreus* Bechst.
Al. pratensis Briss. — *Motac. spipola* Pall. — *Al. turdina* Scop. — *Al. minor* Bewick. — *Pipastes arboreus* Kaup — *Dendronanthus trivialis* Blyth. — Pl. enl. 660. 1. — Gould Birds Eur. 139. — Temm. et Schleg. Faun japon. 23.
 Im Winter im nördlichen Afrika.
411. *Macronyx* (Sws.) *capensis* Gr.
Al. capensis L. — Pl. enl. 504. 2. — Le Vaill. Ois. d'Afr.

195. — *Macronyx flavicollis* Sws. — Rüpp. N. Wirbelth. 38. 2.
Mit Ausnahme der westlichen Länder über ganz Afrika verbreitet.
412. *Macronyx flavigaster* Sws.
Birds West. Afr. I. p. 215. — *Al. crocea* Vieill. Enc. t. 232. 2.
— Jardine Selby Ill. of Ornith. t. 22. — Hartl. Synops. sp. 168.
Von Senegambien bis an's Cap an der Westküste.
413. *Macronyx Ameliae* Tarrag.
Gr. Gen. of Birds t. 54.
Von Port Natal und der Kafferei.

2. FAM. TURDIDAE.

1. Subfam. FORMICARINAE.

414. *Pitta* (Vieill.) *angolensis* Vieill.
Nouv. Dict. IV. p. 356. — Hartl. Synops. sp. 170.
Angola.
- 415? *Pitta pulih* Fras.
Proceed. Zool. Soc. X. p. 190. — Allen Nig. Exp. II. p. 495
— Hartl. Synops. sp. 169.
Sierra Leone.
416. *Philepitta* (Is. Geoffr.) *sericea* Geoff.
Mag. de Zool. 1839. p. 3. — O des Murs. pl. p. 32.
Madagascar.
417. *Ph. Geoffroyi* O des Murs.
Rev. zool. 1846 p. 241. — O des Murs pl. p. 33.

2. Subfam. TURDINAE.

418. *Chaetops* (Sw) *frenatus* Gr.
Ch. Burchelli Sw. — *Malurus frenatus* Temm. Pl. col 385.
Südafrika.
419. *Turdus viscivorus* L.
Pl. enl. 489. — Gould Eur. 77. — Naum. V. D. 66. 1.
Ueberwintert nach Rüppell in Egypten, was jedoch nur aus-
nahmsweise geschehen muss
420. *Turdus guttatus* Vig.
Smith. Illustr. Afr. Zool. t. 39.
Südafrika.
421. *Turdus pilaris* L.
Pl. enl. 490. — Gould Birds Eur. 76. — Naum. V. D. t. 672.
Nach Rüppell im Winter in Egypten.
422. *Turdus musicus* L.
Pl. enl. 406. — Gould Birds Eur. t. 78. 1. — Naum. V. D.
t. 66. 2.
Im Winter in Egypten.
423. *Turdus simensis* Rüpp.
Neue Wirbelth. t. 29. 1. — Lath. Gen. hist. of Birds V. p. 23.
Häufig in Abyssinien und Kordofan
424. *Turdus iliacus* L.
Pl. enl. 51. — Gould Birds Eur. 78. 2. — Naum. Vög. Deutschl.

- Nach Bonap. Consp. p. 270 in Nordafrika?
425. *Turdus olivaceofuscus* Hartl.
Beitr. zur Orn. Westafr. p. 50. — Id. Abh. des nat. Vereins.
Hamb II. t. 3. — Id. Syn. sp. 179.
Insel St. Thomä.
426. *Turdus merula* L.
Pl. enl. 2 mas, 555 fem. — Gould Birds Eur t. 72. — Naum.
V. D. t. 71.
Ueberwintert einzeln in Egypten.
427. *Turdus torquatus* L.
Pl. enl. 516. — Gould Birds Eur. 73.
Nach Keyserl. und Blas. in Egypten?
428. *Turdus olivaceus* L.
Merula olivacea Blyth. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 98. 99. 100.
— Briss. Orn. II 23. f. 3.
Süd- und Centralafrika, nordwärts bis Abyssinien.
430. *Turdus Cabanisii* Bonap.
Cab Museum Heinean. I. p. 3. no. 24.
Südafrika.
431. *Turdus libonyanus* Sm.
Birds of S. Afr. 38.
Südafrika.
432. *Turdus icterorhynchus* P. v. Württ.
In den Nilquellenländern nordwärts bis Nubien. Die spezifische
Verschiedenheit dieser Art von der vorigen ist nicht sicher.
433. *Turdus africanus* Jacq.
Vögel t. 14.
434. *Turdus Smithi* Bonap.
Merula obscura Smith. Birds of S. Afr. t. 36.
Südafrika.
435. *Turdus strepitans* Sm.
Birds of S. Afr. t. 37.
Südafrika.
436. *Turdus guttatus* Vig.
Sm. Birds of S.-A
Südafrika.
437. *Monticola* (Boie) *cyana* Cab.
Turd. cyanus Lin. — *T. solitarius* Gm. — *T. azureus* Cresp.
— *Petrocosyphus longirostris* Blyth. — Pl. col. 250. — Edw.
Birds t. 18. — Gould Birds Eur. t. 87.
Im nördlichen Afrika bis Abyssinien.
438. *Monticola saxatilis* Cab.
Turdus saxatilis Lin. — *Lanius infaustus* Gm. — *Sax. mon-*
tana Koch. — *Petrocos. saxatilis* Boie. — Pl. enl. 562. — Gould
Birds Eur. t. 86.
In ganz Nordafrika.
439. *Monticola rupestris* Cab.
Turdus rupestris Vieill. — *T. rupicola* Licht. — *T. rocar*

- Steph. — *Petrocincla montana* Sw. — Le Vaill. Ois d'Afr. 101 102.
 Im südlichen Afrika; vielleicht auch in Sennaar.
440. *Monticola exploratrix* Cab.
Turdus explorator Vieill. — *T. perspicax* Shaw. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 103. — Nat. Misc. 961.
 Südafrika.
441. *Lioptilus nigricapillus* Cab.
 Mus. Hein. I. p. 88. — *Turd. nigricapillus* Vieill. — *Turd. cucullatus* Illig. — *Gracula cucullata* Licht. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 108.
442. *Cercotrichas* (Boie) *erythroptera* Rüpp.
Turd. erythropterus Gm. — *Sphenura erythropt.* Licht. — *Argya erythr.* Lafr. — Dict. d'Orb. II. p. 126. — Boie Isis 1831. p. 542. — Hartl. Synops. 171.
 Senegambien, Nord-Ost-Afrika.
443. *Cercotrichas luctuosa* Cab.
 Mus. Hein. I. p. 41. — *Sphenura erythroptera* var. *arabica* Ehrenb. — *Argya luctuosa* Lafr. — Hartl. Synops. sp. 172.
 Senegambien, Nord-Ost-Afrika.
444. *Bessonornis* (Smith) *vociferans* Gray.
Turdus reclamator Vieill. — *T. vociferans* Sw. — *T. revocator* Temm — *T. chrysogaster* Vieill. — *Muscic. bicolor* Sparm. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 104. — Zool. Illustr. III. t. 180. — Pl. enl. 221. — Sparm. Mus. Carls. t. 46. — Hartl. Syn. sp. 173.
 Süd- und Westafrika.
445. *Bessonornis phoenicurus* Müll.
Mot. pectoralis Shaw. — *Sax. superciliaris* Licht. — *Petrocincla superciliosa* Sw. — *Turd. phoenicurus* Gm. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 111. — Nat. Misc. t. 965.
 Südafrika.
446. *Bessonornis natalensis* Gr.
Cossypha natalensis Sm. — Illustr. Zool S. Afr. t. 60.
 Süd-Ost-Afrika.
447. *Bessonornis humeralis* Sm
Cossypha humeralis auct. — Sm. Illustr. S. Afr. Zool. t. 48.
 Südafrika.
448. *Bessonornis albicapillus* v. Müll.
Turd. albicapillus Vieill. — *Petrocincla leucoceps* Sw. — *T. albiceps* Cuv — Lath. Gen. hist. V. p. 101. — Sw. Birds West. Afr. I. p. 282. — Hartl. Synops. sp. 174. — v. Müll. Beitr. zur Ornith. Afrika's. Taf. XXIII.
 Westküste.
449. *Bessonornis Swainsoni* v. Müll. (1849).
Petrocincla albicapilla Swains. (nec Vieill.) — *Cossypha verticalis* Hartl — *Bessonornis verticalis* Cab. — Hartl. Synops. sp. 175. — Sws. Birds of West. Afr. p. 284. t. 32. — v. Müll. Beitr. zur Ornith. Afr. t. XXIII.

Nordost- und Westafrika.

450. *Bessonornis semirufa* Rüpp.
Cossypha nigricapilla Gner. — Rüpp. Syst. Uehers. Vgl. Nord-Ost-Afr. t. 21.
 Abyssinien.
451. *Bessonornis gutturalis* Gr.
Cossypha gutturalis Guér. Rev. Zool. 1843. p. 162. — Bonap. Consp. p. 301.
 Nord-Ost-Afrika.
452. *Bessonornis cyanocampter* Cab.
 Bonap. Consp.
 Westafrika.
453. *Besson. poënsis* Strickl
Cossypha poënsis Fras. Zool. typic. — Strickl. Proc. Zool. Soc. 1844. p. 100. — Allen Nig. Exp II. p. 496. — Hartl. Synops. sp. 176.
 Westafrika.
454. *Besson. brevipes* Gr.
Cossypha brevipes Waterh. — App. Alex. Exp. Disc. S. Afr. — Bonap. Consp. p. 301.
 Südafrika.
455. *Besson. auraticollis* Gr.
Turd. auraticollis Vieill. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 19.
 Süd? - Afrika
456. *Besson. diadematus* Bonap.
Turdus diadematus Temm. — Hartl. Synops. sp. 177. — Bonap. Consp. p. 302.
 Guinea.

3. Subfam. TIMALINAE.

457. *Crateropus* (Sw.) *bicolor* Jard.
 Edinb. Journ. nat. sc. III. t. 3. — Smith Illustr. S. Afr. Zool. Av. — Bonap. Consp. p. 278.
 Südafrika.
458. *Crateropus Reimwardtii* Sw.
 Sws. Zool. Illustr. II. t. 80. — Sws. Birds of West. Afr. I. p. 276. — Hartl. Synops. sp. 180.
 Senegambien.
459. *Crat. leucocephalus* Rüpp.
 Atl. t. 4.
 Nubien, Abyssinien und Kordofan.
460. *Crat. plebejus* Gr.
Izos plebejus Rüpp. Atl. t. 23.
 Nubien und Kordofan, seltener in Egypten.
461. *Crat. platycercus* Sws.
 Birds of West. Afr. I. p. 274. — Hartl. Synops. 181.
 Senegambien.
462. *Crat. atripennis* Sws.

- Phyllantus capucinus* Less. — Sws. Birds of West. Afr. I. p. 278.
— Hartl. Synops. sp. 182.
Gambia, Sierra Leone.
463. *Crat. atriceps* Gr.
Cr. orioloides Sws. — *Moho atriceps* Less. — *Hypochloereus atriceps* Cab. Mus Hein I p. 85. — Hartl. Synops. sp. 183. — Sws. Birds of West. Afr. I. t. 31.
Süd- und Westafrika.
464. *Crat. leucopygius* Rüpp.
Neue Wirbelth. t. 30. 1.
Abyssinien.
465. *Crat. rubiginosus* Rüpp.
Syst. Uebers der Vögel Nord-Ost-Afr. t. 19.
466. *Crat. limbatus* Rüpp. p. Harris.
Rüpp. System. Uebers d. Vögel Nord-Ost-Afr. p. 47.
Schoa (Abyssinien).
467. *Crat. Swainsonii* Smith.
Illustrat. S. Afr. Zool. — Bonap. Consp. p. 278.
468. *Crat. Jardinii* Smith.
Sm. Ill. S. Afr. Zool. av. t. 6.
Südafrika.
469. *Crat. acaciae* Bonap.
Cr. acaciae Rüpp. Atl. t. 18. — *Sphenura acaciae* Licht. Cat. p. 40. no. 454. — *Argya acaciae* Cab.
Egypten und Nubien.
470. *Crat. squamiceps* Rüpp.
Atl. tab. 12. — *Argya Rüppellii* Less. — *A. squamiceps* Cab.
Nord-Ost-Afrika, (am rothen Meere.)

4. Subfam. ORIOLINAE.

471. *Oriolus galbula* L.
Coracias oriolus Scop. — *Turd. oriolus* Br. — Pl. enl. 26.
— Edw. Birds t. 185. — Gould Birds Eur. t. 71. — Naum. Vgl. t. 40. — Roux. Orn. prov. t. 125. 126. 127.
Nordafrika und Arabien.
472. *Oriolus auratus* Vieill.
Oriolus bicolor Temm. — Sws. Birds of West. Afr. II. t. 1. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 260. — Vieill. Enc. Meth. 695. — Vieill. Gal. t. 83. — Hartl. Synops. sp. 184.
Südafrika; Senegambien, Nigritien, selten in Ost-Sudan.
473. *Oriolus larvatus* Licht.
Or. melanocephalus var. Vieill. — *Or. coudougnan* Temm. — *Or. chloris* Cuv. — *Or. capensis* Sws. — *O. monachus* Wagl. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 261. 262. — Sws. Birds of West. Afr. II. p. 31. — Vieill. Enc. p. 696. — Wagl. Syst. av. sp. 7. — Hartl. Synops. sp. 185.
Südafrika, Senegambien und Ostafrika.
474. *Oriolus brachyrhynchus* Sws.

- Birds of West. Afr. II. p. 35. — Hartl. Synops. sp. 186.
Sierra Leone.
475. *Oriolus meloxita* Rüpp.
Turd. monacha Gm. — Rüpp. Neue Wirbelth. t. 12 1.
Abyssinien.
476. *Oriolus arundinarius* Burch.
Trav. in S. Afr. I. p. 464. 501.
Südafrika.
477. *Oriolus Baruffi* Bonap.
Or. intermedius Hartl. Beitr. z. Orn. Westaf. p. 46.
Ashantee.
478. *Oriolia* (Is Geoffr.) *Bernieri* J. Geoffr.
Mag. de Zool. ois. t. 4.
Madagascar.
- 5 Subfam. PYCNONOTINAE.
479. *Trichophorus barbatus* Temm.
Tr. strigilatus Sws. Birds of West. Afr. t. 28. — Less. Compl.
VI. p. 98. — Pl. col. 88. — Hartl. Synops. sp. 188.
Süd- und Westafrika, (Sierra Leone.)
480. *Trichophorus olivaceus* Sws.
Tr. mentalis Temm. Mus Lngd. — Sw. Birds of West. Afr. I.
p. 264. — Hartl. Synops. sp. 189.
Senegambien.
481. *Trichophorus icterinus* Temm.
Bonap. Consp. p. 262. — Hartl. Synops. sp. 190.
Guinea.
482. *Trichophorus gularis* Sws.
Tr. tephrogenys Jard. Selb. Ill. t. 127. — Sws. Birds of West.
Afr. II. p. 266. — Hartl. Synops. sp. 191.
Gambia, Sierra Leone.
483. *Trichophorus poliocephalus* Temm.
Bonap. Consp. p. 262. — Hartl. Synops. sp. 192.
Guinea.
484. *Trichophorus canicapillus* Hartl.
Beitr. zur Orn. Westaf. S. 24. — v. Müll. Beitr. zur Ornith.
Afr. t. XIX. — Hartl. Synops. sp. 193.
Sierra Leone. Gambia.
485. *Trichophorus chloris* Valenc.
Lanius chloris Valenc. Dict. des sc. nat. vol. 40. p. 226. —
Hartl. Synops. sp. 193. — v. Müll. Beitr. zur Orn. Afr. t. . . .
Galam, (Westafrika.)
486. *Trichophorus syndactylus* Sws.
Dasycephala syndactyla Sws. Birds of West. Afr. I. p. 261. —
Hartl. Synops. sp. 195.
Sierra Leone.
487. *Andropadus* (Sws.) *importunus* Gr.
Turd. importunus Vieill. — *Turd. clamosus* Steph. — *Ixos*
importunus Temm. — *Polyodon importunus* Lafr. — *Andropadus*

vociferus, familiaris Sw. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 106. 2. — Mag. Zool. 1832. t. 4.

Südafrika.

488. *Andropadus latirostris* Strickl.

Ann. Nat. Hist. XV. p. 127. — Bonap. Consp. 261. — Hartl. Synops. sp. 202.

Fernando Po.

489. *Andropadus gracilirostris* Strickl.

Ann. Nat. Hist. XV. p. 127. — Bonap. Consp. 261. — Strickl. Proceed. Soc. 1844. p. 100. — Hartl. Synops. sp. 203.

Fernando Po.

490. *Pycnonotus* (Kuhl) *aurigaster* Gr.

Haematornis aurigaster Sws. — *Turd. aurigaster* Vieill. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 107. — *Brachypus aurigaster* Cab.

Südafrika.

[Das afrikanische Vaterland beruht sicherlich nur auf dem von Le Vaillant eingeführten Irrthume. D. Herausg.]

491. *Pycnonotus ashanteus* v. Müll.

Ixos ashanteus Bonap. Consp. p. 266. — Verr. Rev. de Zool. 1851. p. 271. — Strickl. Contrib. 1851. p. 132. — Hartl. Synops. sp. 196.

Ashantee und Gaboon.

492. *Pycnonotus arsinoë* Gr.

Ixos arsinoë Licht. Doubl. Cat. sp. 442.

Häufig in Nord-Ost-Afrika

493. *Pycnonotus obscurus* Bl.

Turd. obscurus Temm. — *Ixos obscurus* Bonap. — *Haematornis lugubris* Less. — *Ixos inornatus* Fras. — Temm. Man. IV. p. 608. — Fras. Proc. Zool. Soc. 1843. p. 27. — Hartl. Synops. sp. 197.

Westafrika.

494. *Pycnonotus flavicollis* Gr.

Haematornis flavicollis Sws. Birds of West. Afr. p. 259. — Hartl. Synops. sp. 198.

Senegambien.

495. *Pycnonotus nigricans* Gr.

Turdus nigricans Vieill. — *Ixos Le Vaillantii* Temm. — *Ixos xanthopygius* Ehrenb. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 106. 1. — Rüpp. Syst. Verz. v. Nord-Ost-Afr. p. 60. — Pl. enl. 317.

Egypten und Nubien.

496. *Pycnonotus capensis* Gr.

Turd. capensis Gm. — Briss. Orn. III. t. 27. 3. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 105. — Bonap. Consp. p. 266.

Südafrika.

497. *Pycnonotus caffer* Gr.

Turd. caffer L. — *Ixos caffer* Bonap. — *Ixos haemorrhous* Temm. — Pl. enl. 563. 1. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 107. 1. — *Brachypus haemorrhous* Cab.

Südafrika.

[Kommt sicherlich, gleich *aurigaster*, No. 490, nicht in Afrika vor.
D. Herausg.]

498. *Bradornis* (Smith) *marequensis* Sm.
Ill. S Afr. Zool. av. t. 113. a. et b.
Südafrika.
499. *Bradornis major* Sm.
Ill. S. Afr. Zool. — Bonap. Consp. p 267.
Südafrika.
500. *Phyllastrephus capensis* Gr.
Ph. terrestris Sws. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 112. 1.
Südafrika.
501. *Phyll. scandens* Sws.
Birds of West. Afr. I. t. 30. — Hartl. Synops sp 201.
Senegambien.
502. *Phyll. lugubris* (Bodd.)
Turd. senegalensis Gm. — Pl. enl. 563. 2. — *Merula senegalensis* Briss. Orn. II. t. 22. 2. — Hartl. Synops. sp. 200.
Senegambien.

3. FAM. MUSCICAPIDAE.

1. Subfam. MUSCICAPINAE.

503. *Platystira* (Jard.) *melanoptera* (Gm.)
Muscicapa melanoptera Gm. — *Musc. collaris* Lath. — *Platyrhynchus collaris* Vieill. — *Platyrh. melanoleucus* Vieill. — *Musc. fimbriata* Licht. — *Platystira lobata* Sws. — *Plat. collaris* mas. et *Desmaresti* fem. Jard — Pl enl. 567. 3. — Briss. Orn. II. t. 36. 1. — Jard. Ill. t. 9. f. 2. — Sws. Birds of West. Afr. II. 22. — Hartl. Synops. sp. 204.
Westafrika.
504. *Plat. pistrinaria* Gr.
Musc. molitor Licht. — *M. pulsator* Steph. — Le Vaill Ois. d'Afr. t. 160.
Südafrika.
505. *Plat. senegalensis* Gr.
Pl. velatus Vieill. — *Musc. senegalensis* Vieill — Pl. enl 567. 1 et 2. — Hartl. Synops. sp. 205 — Briss. Orn II. t. 37. f. 1 et 2.
In Westafrika, Nubien, Abyssinien und Kordofan.
506. *Plat. pririti* Gray.
Musc. pririti Vieill. — *Musc. strepitans* Licht. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 161.
Südafrika.
507. *Plat. torquata* Gr.
Musc. torquata L. — Pl enl 572. 2.
Südafrika.
508. *Plat. capensis* Gr.
Musc. capensis L. — Pl. enl. 572. 1.
Südafrika

509. *Plat. monacha* Gr.
Le Vaill. Ois. d'Afr. 159.
Süd-Ost-Afrika.
510. *Plat. brevicauda* Sws.
Nat. Libr. X, Flycatch. p. 159.
Süd-West-Afrika.
511. *Plat. leucopygialis* Fras.
Zool. typ. part. 5. fig. — Fras. Proceed. 1842. p. 142 mas. et
p. 141 fem. — *Pl. castanea* Strickl. Contrib. 1851. p. 163. —
Hartl. Synops. sp. 206.
Fernando Po, Gaboon
512. *Plat. scita* Gr.
Stenostira scita Cab. Bonap. — *Musc. scita* Vieill. — *Musc.*
tenella Licht. — *Pl. longipes* Sws. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 154.
— Sws. Nat. Libr. X. t. 21.
Südafrika.
513. *Bias* (Less.) *musicus* Vieill.
Platyrrhynch. musicus Vieill. Dict. Hist. nat. vol. 27. p. 15. —
Myiagra flavipes Sws. Nat. Libr. Flyc. p. 255. 208.
Congo.
514. *Smithornis capensis* Bp.
Platyrrh. capensis Smith Ill. S. Afr. Zool. t. 27. — Bonap.
Consp. p. 322.
Südafrika.
515. *Tschitrea* (Less.) *cyanomelas* Gr.
Musc. cyanomelas Vieill. — *Musc. scapularis* Steph. — *Tro-*
chocercus cyanomelas Cab. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 151.
Südafrika.
516. *Tschitrea cristata* Gr.
Musc. cristata Gm — *Muscipeta castanea* Temm. — *Muscip.*
perspicillata Sws. — *Platyrrh. cristatus* Vieill. — Briss. Orn. II.
t. 39. 2. — Pl. enl. 573. 2. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 142 143.
— Sws. Birds of West. Afr. II. p. 59. 60.
Senegambien, Süd- und Centralafrika.
517. *Tschitrea mutata* Gr.
Muscic. mutata Gm. — *Muscipeta bicolor* Sws Birds of West.
Afr. II. p. 60 — Pl. enl. 248. 2. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 148.
Madagascar.
518. *Tschitrea viridescens* Gr.
Muscic. mutata var. Lath — *M. holosericea* Temm. — *Musci-*
peta rufa Sws. — Pl. enl. 248. 1. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 147.
— Sws. Birds of West. Afr. II. p. 60.
Südafrika.
519. *Tschitrea Casamansae* Less.
Muscipeta rufiventris Sws. Birds of West. Afr. II. t. IV. —
Annales des sc. nat. IX. p. 173. — Less. Rev. Zool. p. 277. m. —
Hartl Synops. sp. 209.
Senegambien und Nigritien.

520. *Tschitrea borbonica* Blyth.
Muscic. borbonica Gm — Pl. enl 573 1. — Le Vaill Ois. d'Afr. t 143. — Bonap Consp. p. 325.
 Madagascar, St. Maurice.
521. *Tschitrea melanogastra* Gr.
Muscip. melanogastra Sws. Birds of West. Afr. II. p. 55. — Verr. Rev. et Mag. de Zool. 1851. p. 310. — Hartl Syn sp. 210.
 Senegambien, Nubien, Kordofan, Sennaar am weissen und blauen Nil, Abyssinien.
522. *Tschitrea nebulosa* Gr
Muscipeta fluvicola Sws. Birds of West. Afr. p. 60. — *Muscic. nebulosa* Vieill. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 149.
 Südafrika
523. *Tschitrea pectoralis* Gr.
Muscip. pectoralis Sws. — *Sylv. melanoleuca* Vieill. — *Muscic. torquata* Gm — *M. capensis* Kuhl. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 150. — Sws. Birds of West Afr II. p. 60.
 Südafrika.
524. *Tschitrea senegalensis* v. Müll.
Muscipeta senegalensis Less. Rev. zool. 1838. p. 279. — Less. Ann. des sc. nat. IX. p. 173. — Hartl. Synops. sp. 211.
 Senegambien, Goldküste.
525. *Tschitrea tricolor* Fras.
 Proceed. Zool. Soc. 1843. p. 3. — Id. Ann. and Mag. vol XII. p. 441. — Hartl. Synops. sp. 212.
 Fernando Po.
526. *Tschitrea Ferreti* Guér.
 Rev. Zool. 1843 p. 162 — Bonap. Consp. p. 326.
 Ostafrika.
527. *Tschitrea Smithii* v. Müll.
Muscipeta Smithii Fras. Proc. Zool. Soc. 1843. p. 34. — Hartl. Synops. sp. 213.
 Westafrika.
528. *Tschitrea atrochalybea* v. Müll. p. Thoms
 Thoms. Ann. et Mag. X. p. 104. — Hartl. Beitr. z. Orn Westaf. p. 46 fem. — Id. Synops. sp 214.
 Fernando Po, St. Thomä.
529. *Tschitrea longicauda* v. Müll.
Muscipeta coerulea Hartl. — *Myiagra longicauda* Sws. Nat. Libr. Flycatch t. 25. — Lath. Gen. hist. IV. p. 90. — Hartl. Synops. sp. 215.
 Sierra Leone.
530. *Muscicapa grisola* L.
 Pl. enl. 565. 1. — Gould Birds Eur. t. 65. — Hartl. Synops. sp 217.
 Wahrscheinlich über ganz Afrika verbreitet?
531. *Muscic. atricapilla* L.
M. nigra Br. — *M. ficedula* Gm. — *M. muscipeta* Bechst. —

- Pl. enl. 565. 2 mas., 668. 1 fem. — Gould Birds Eur. 63. 1. —
Edw Birds t. 30. 1. 2.
Nord-Ost-Afrika.
532. *Muscic. albicollis* Temm
M. collaris Bechst. — *M. streptophora* Vieill — Gould Birds
Eur. t. 63 2. — Temm. Mau. I. p. 153
In Arabien.
533. *Muscic. adusta* Gr.
Muscic. undulata Gm. — *Butalis adusta* Boie. — *Muscic.*
undulata Licht. — *Alseonax undulata* Cab. — Le Vaill. Ois
d'Afr. 156.
Südafrika.
534. *Muscic. chocolatina* Rüpp.
System. Uebers. Nord-Ost-Afr. t. 20.
Abyssinien.
535. *Muscic. semipartita* Rüpp.
Neue Wirbelth t. 40. 1.
Kordofan.
536. *Muscic. lugubris* v. Müll.
Beitr. z. Orn. Afr. tab. II. — Naumannia, 1851, IV, p. 27.
Abyssinien.
537. *Muscic. pallida* v. Müll.
Beitr. zur Orn. Afr. tab. VIII. — Naumannia, 1851, IV, p. 27.
Kordofan und Abyssinien.
538. *Muscic. albifrons* Sparrm.
Mus. Carls. t 24.
Südafrika.
539. *Muscic. Fraseri* Strickl.
Proceed. Zool. Soc 1843. p. 102. — Id Ann. Nat. Hist. XV.
p 128. — Hartl. Synops. sp. 216.
Südafrika.
540. *Muscic. picata* Swains.
Nat. Libr., Flycatcher, p. 254. — Hartl. Synops. sp. 218.
Westafrika.
- 541.? *Muscic. azurea* Cuv.
Le Vaill Ois d'Afr. 138.
Südafrika.
- 542.? *Muscic. madagascariensis* Gm.
Briss. III. t. 24. 5.
Madagascar.
Quid *Muscic. rufiventris*. Pl. enl. 572. 2?
Quid *Muscic. latirostris* Sws.? Quid *Muscic. ruficauda* Sws.?
542. *Hyltiota* (Sws.) *flavigastra* Sws.
Birds of West. Afr. II. p. 47. — Id. Nat. Libr. Flyc. p. 28.
Senegambien.
544. *Hyltiota violacea* Verr.
Rev. et Mag. de Zool. 1851. p. 308. — Strickl. Contrib. 1851.
p. 132. — Hartl. Synops. sp. 220.
Gaboon.

4. FAM. AMPELIDAE.

1. Subfam. DICRURINAE

545. *Melaenornis* (Gr.) *edolioides* Sws
Melasoma edolioides Sws. Birds of West. Afr. I. t. 29. —
Argya edolioides Lafr. — Bonap. Consp. p. 350. — Hartl. Synops sp. 221.
 Gambia, Ilha dos Rollas, Abyssinien
546. *Melaenornis ater* v. Müll. p. Bonap.
Melanosoma atra Sundev. Mus. Holm. — Bonap. Consp. p. 350.
 Kafferei.
547. *Melaenornis taeniopterus* v. Müll. p. Bonap.
Melanosoma taenioptera Sundev. Mus. Holm.
 Kafferei.
548. *Melaenornis simplex* v. Müll. p. Bonap.
Melanosoma simplex Sundev. Mus. Holm.
 Kafferei.
549. *Artamus* (Vieill.) *viridis* Gm.
Ocypterus viridis Cuv. — Pl. enl. 32. f. 2.
 Madagascar.
550. *Dicrurus* (Vieill.) *cristatus* Vieill.
Lanius forficatus L. — *L. drongo* Shaw. — *Muscicapa galeata* Bodd. — Pl. enl. 189. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 166.
 Madagascar.
551. *Dicrourus mystaceus* Vieill.
 N. dict. d'hist. n. IX. 583. — *Muscicapa divaricata* Licht.
 Doubl. p. 52. — Le Vaill. Ois. d'Afr. t. 169 — Hartl. Syn. sp. 227.
 Senegambien, Kordofan.
552. *Dicrourus lugubris* Gr.
Edolius lugubris Ehrenb. Symb. Phys. t. 8. f. 3. — Bonap. Consp. p. 352.
 Abyssinien, Sennaar und Kordofan
553. *Dicrourus Ludwigii* Smith.
 Ill. S. Afr. Zool. t. 34
 Südafrika.
554. *Dicrourus canipennis* Sws.
 Birds of West Afr. I. p. 254. — Hartl. Syn. sp. 223.
 In Westafrika; nicht identisch mit *D. lugubris* Ehrenb.
555. *Dicrourus musicus* Vieill.
 N. dict. IX. p. 586. — Le Vaill. Ois. d'Afr. 167. 168. —
 Hartl. Synops. sp. 222.
 Im südlichen und westlichen Afrika.
556. *Dicrourus emarginatus* Sundev.
Muscicapa emarginata Licht. — *Edol. emarginatus* Licht. —
 Temm. Bonap. Consp. p. 352.
 Nubien.
557. *Dicrourus atripennis* Sws.
 Birds of West Afr. I. p. 256. — Hartl. Syn. sp. 224.
 Sierra Leone.

558. *Dicrourus madestus* Hartl.
Rev. et Mag. de Zool. 1849. p. 495. — Hartl. Beitr. z. Orn.
Westaf. t. 4. Id. Synops. sp. 225.
559. *Dicrourus coracinus* Verr.
Rev. et Mag. Zool. 1851. p. 311. — Strickl. Contrib. 1851. p. 132.
Gaboon.
2. Subfam. CAMPEPHAGINAE.
560. *Campephaga nigra* Vieill.
Campeph. flava (fem) Vieill. — *Campeph. atrata* Sws. —
Ceblepyris ater Less. — Le Vaill. Afr. t. 165.
Südafrika.
561. *Campephaga phoenicea* Sws.
Ampelis phoenicea Lath. — *Turd. phoenicopterus* Temm —
Tanagra dubia Sparrm. — *Ceblepyris melanoxantha* Licht. (fem.)
— *Ceblep. flava* Licht. (fem.) — Lath. Synops. 146. 10. — Pl.
col. 71. — Sws. Birds of West. Afr. I. t. 27 28 — Le Vaill. Afr.
164. (fem) — Nat. Misc. t. 252. — Hartl. Synops. sp. 228.
Senegambien, Sennaar, Abyssinien.
562. *Campephaga caesia* Gr.
Ceblep. caesia Licht. — *Ceblep. Le Vaillantii* Temm. — Le
Vaill Afr. t. 162. 163.
Kafferei
563. *Campephaga cana* (Lin.) — Pl. enl. 541.
Madagascar.
564. *Campephaga xanthornoides* Less. An. des sc. n. 1838. pag. 169.
— Cab Mus. Hein. p. 61.
Gambia.
565. *Campephaga labrosa* Gr.
Edolius labrosus Sws. — *Lanicterus Swainsonii* Less. — Sws.
Zool. Ill. t. 179. — Bonap. Consp. p. 356.
West? - Afrika.
566. *Ceblepyris* (Cuv.) *pectoralis* Sws.
Graucalus pectoralis Jard et Selb. Ill. of Orn. t 57. — *Py-
cnonotus niveoventer* Less Rev. Zool. 1840. p. 226. — Sws.
Birds of West. Afr. I. p. 249. — Hartl. Synops. sp. 230.
Gambia, Guinea, Abyssinien.
567. *Ceblepyris azurea* Cass.
Graucalus azureus Cass. Proc. Acad. Philad. 1851. p. 348. —
Hartl Synops. sp. 231.
Sierra Leone.
? *Ceblepyris Jardinii* Rüpp.
? *Ceblepyris affinis* Rüpp. Orn. Misc 1839. p. 35.
568. *Lobotos* (Reichenb.) *Temminckii* Hartl.
Ceblepyris lobatus Temm. — *Campephaga lobata* Gr. — *La-
nicterus lobatus* Less. — Pl col. 279. 280. — Schinz Abb. Vög.
t. 31. — Less. Rev. Zool. 1839. p. 197. — Hartl. Synops. sp. 232.
Guinea.